

FAUNA CARACTERÍSTICAS DE CARTAYA



Ayuntamiento
de Cartaya

AVES



Ayuntamiento
de Cartaya

LAS AVES DEL PINAR

- Los pinares de Cartaya se encuentran en una situación privilegiada como puente entre el Andévalo y la costa onubense, con sus importantes humedales como son las marismas del Río Piedras. La heterogeneidad del relieve del monte Cartayero, influye también en la alta diversidad de especies avícolas.
- En el Campo común de Abajo podemos encontrar especies propias de marisma, que sobrevuelan el pinar de paso entre las Marismas del Odiel y las Maristas del Río Piedras, contribuyendo a la riqueza de aves en la zona.
- Las aves más frecuentes tanto en el Campo Común de Arriba, como en el de Abajo son el pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*), curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*), curruca rabilarga (*Sylvia undata*), carbonero mayor (*Parus major*), mito (*Aegithalos caudatus*), tórtola turca (*Streptopelia decaocto*), totovía (*Lullula arborea*), jilguero (*Carduelis carduelis*), verdecillo (*Serinus serinus*), Petirrojo (*Erithacus rubecula*), mosquitero común (*Phylloscopus collybita*). EN INVIERNO Rabilargo (*Cyanopica cyanus*), mirlo común (*Turdus merula*), verderón (*Carduelis chloris*), agateador común (*Certhia brachydactyla*), zorzal charlo (*Turdus viscivorus*) y pico picapinos (*Dendrocopos major*).



LAS AVES ACUÁTICAS EN CARTAYA

- La avifauna de la marisma está dominada por especies limícolas (viven en el limo) y láridos (gaviotas y afines), que se encuentran adaptadas para encontrar en este medio el alimento necesario.
- En el interior del Paraje Natural, existen pequeños bosquetes de pinos que acogen gran cantidad de paseriforme como jilgueros, verdecillos, mirlos, rabilargos, urracas y currucas cabecinegras.
- La laguna de las Borreras es un espacio ideal para observar a la focha común (*Fulica atra*), el anade real (*Anas platyrhynchos*), el calamón común (*Porphyrio porphyrio*), la espátula (*Platalea leucorodia*).
- Otras especies que podemos observar en las marismas son la cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*), la garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*), la garceta común (*Egretta garcetta*) o la garza real (*Ardea cinerea*).



MAMÍFEROS



Ayuntamiento
de Cartaya

- Los pinares de Cartaya, sirven como refugio a numerosos mamíferos, que encuentran aquí el cobijo y el alimento suficiente para su supervivencia.
- En los pinares de Cartaya encontramos especies cinegéticas como el conejo (*Oryctolagus cuniculus*) en zonas más densas y la liebre ibérica (*Lepus granatensis*) en zonas más despejadas.
- Entre los mamíferos de menos tamaño, podemos encontrar el ratón de campo (*Apodemus sylvaticus*), el lirón careto (*Eliomys quercinus*) y el erizo común (*Erinaceus europaeus*).
- Entre los vivérridos encontramos al meloncillo (*Herpestes ichneumon*), del que podemos observar rastros en los arroyos con buena cobertura arbustiva.
- Los mustélidos que podemos encontrar son el tejón (*Meles meles*) principalmente en zonas interiores de pinar, el turón (*Mustela putorius*) asociado a las orillas de los ríos y lagunas, la gineta (*Genetta genetta*), muy versátil en cuanto a hábitat y la nutria (*Lutra lutra*) que se encuentra en cauces con abundante vegetación y con escasa perturbación antrópica. Debemos destacar a la nutria porque se encuentra catalogada con Vulnerable a la extinción.



REPTILES



Ayuntamiento
de Cartaya

- La especie de lacértidos más frecuente es la lagartija colilarga (*Psammodromus algirus*) y en segundo lugar el lagarto ocelado (*Lacerta lepida*). El lagarto ocelado es de mayor tamaño, prefiere lugares abiertos utilizando como refugio cúmulos de piedras, muros, canchales o arbustos espesos, y suele solearse en los márgenes de las carreteras o en el asfalto, con el consiguiente peligro de muerte por atropello.
- Otras especies de reptiles presentes en Cartaya son la culebrilla ciega (*Blanus cinereus*), el galápago leproso (*Mauremys leprosa*), el eslizón ibérico (*Chalcides bedriagai*), la lagartija cenicienta (*Psammodromus hispanica*), la salamanguera común (*Tarentola mauritanica*).
- Además encontramos algunos ofidios como la culebra de escalera (*Elaphe scalaris*), culebra bastarda (*Malpolon monspessulanus*) y culebra lisa meridional (*Coronella girondica*), que se encuentran fundamentalmente en el pinar.
- Entre los anuros que podemos encontrar destaca por su abundancia el sapo corredor (bufo calamita), que es fácilmente observable en las carreteras forestales, el sapo común (*Bufo bufo*), la rana común (*Rana perezi*) y la ranita meridional (*Hyla meridionalis*). Una buena zona para observarlos serían los alrededores del Canal del Piedras.



LA LAGARTIJA COLILARGA (*Psammodromus algirus*)

El la especie de lacértidos más abundante en Cartaya, es muy común en pinares y eucaliptales, aunque la podemos ver por todo el término municipal.

Llega a medir hasta unos 30 cm. de longitud total, de los que aproximadamente dos tercios corresponde a su larga cola.

Suele refugiarse en la base de las matas y se solea en los caminos donde es frecuente encontrarlas.



RANITA MERIDIONAL (*Hyla meridionalis*)

La ranita meridional, vive generalmente en lugares húmedos con buena cobertura vegetal. Se oculta entre la vegetación pudiendo alejarse fuera de la época de cría. Esta especie merece una mención especial porque se encuentra catalogada como “casi amenazada”.

Un buen lugar para observarla es la laguna de las Borreras en El Rompido, donde esta encuentra durante todo el año la humedad que necesita.

